

Version: AD 5.1 (2024.08.26修订)

## SPARKeasy Superpure Midi Plasmid Kit

## 高纯度质粒小提中量试剂盒

(离心柱型)

目录号: AD0104

## 01/产品组分

序号	组分	50 次 AD0104
1	RNase A (10 mg/mL)	250 µL
2	溶液 P1	25 mL
3	溶液 P2	25 mL
4	溶液 P3	25 mL
5	去蛋白液 PE	16 mL 第一次使用前加入 9.4 mL 无水乙醇
6	漂洗液 WB	20 mL 第一次使用前加入 60 mL 无水乙醇
7	洗脱缓冲液 EB	15 mL
8	吸附柱 AC	50 个
9	收集管 (2 mL)	50 个

## 02/保存条件

本试剂盒所有组分室温 (15-25°C) 保存。

## 03/产品概述

本试剂盒采用改进 SDS-碱裂解法裂解细胞, 操作简单方便, 1 h 内可完成单个样本的抽提工作。离心吸附柱内的硅基质膜在高盐、低 pH 值状态下选择性地结合溶液中的质粒 DNA, 再通过去蛋白液和漂洗液将杂质和其它细菌成分去除, 最后低盐、高 pH 值的洗脱缓冲液将纯净质粒 DNA 从硅基质膜上洗脱。

**推荐使用量及产量:** 高拷贝质粒推荐使用量 5-15 mL, 得率可多达 40-90 µg; 低拷贝质粒或大于 10 kb 的大质粒, 推荐使用量 10-20 mL, 同时按比例增加溶液 P1、溶液 P2、溶液 P3 的用量, 其它步骤相同。

## 04/自备材料

异丙醇、无水乙醇

## 05/注意事项


### 请务必在使用本试剂盒之前阅读此注意事项

- ◇ 所有离心操作步骤，均在室温（15-25℃）下进行。
- ◇ 第一次使用时，将试剂盒所带的全部 RNase A 加入溶液 P1 后（终浓度 100 µg/mL）置于 4℃ 保存。如果溶液 P1 中 RNase A 失活，提取的质粒可能会有微量 RNA 残留，在溶液 P1 中补加 RNase A 即可。
- ◇ 环境温度低时溶液 P2 中 SDS 可能会析出浑浊或者沉淀，可在 37℃ 水浴加热帮助溶解，不要剧烈摇晃，以免形成过量泡沫
- ◇ 避免试剂长时间暴露于空气中产生挥发、氧化、pH 值变化，各溶液使用后应及时盖紧瓶盖。
- ◇ 初次使用前请先在漂洗液 WB 瓶中加入指定量无水乙醇，充分混匀，加入后请及时在方框打钩标记已加入乙醇，以免多次加入！

## 06/使用方案

1. 取 5-15 mL 过夜培养的菌液，12,000 rpm（13,400×g）离心 1-2 min，尽可能的倒干上清，收集菌体。
2. 加 500 µL 溶液 P1 重悬菌体沉淀，涡旋振荡至彻底悬浮，全部转入一个 2 mL 离心管。
  - ▲ 如果有未彻底混匀的菌块，会影响裂解，导致提取量和纯度偏低。
3. 加 500 µL 溶液 P2，温和地上下翻转 4-7 次使菌体充分裂解，室温放置 4 min。
  - ▲ 温和地混合，不要剧烈震荡，以免基因组 DNA 剪切断裂！所用时间不应超过 5 min，以免质粒受到破坏。此时菌液应变得清亮粘稠，如果菌体少，很快清亮粘稠后就可以做下一步。
4. 加 500 µL 溶液 P3，立即温和地上下翻转 6-8 次，充分混匀时会出现白色絮状沉淀。12,000 rpm（13,400×g）离心 10 min，小心取上清至新管，避免吸取到白色沉淀。
  - ▲ 加入溶液 P3 后应该立即混匀，以免产生 SDS 的局部沉淀。如果上清中还有微小白色沉淀，可再次离心后取上清。
5. 向上层水相中加入 0.5 倍体积异丙醇（约 740 µL）后充分颠倒混匀后分多次（每次不超过 700 µL）转入吸附柱 AC 中（吸附柱放入收集管中），12,000 rpm（13,400×g）离心 1 min，倒掉收集管中的废液。直到所有混合溶液通过此吸附柱。
6. 可选步骤：加入 500 µL 去蛋白液 PE（请先检查是否已加入无水乙醇！），12,000 rpm（13,400×g）离心 30 s，弃废液。
  - ▲ 此步骤为了去除痕量核酸酶等杂质，如所用菌株为 JM 系列、HB101 等 endA 菌株或野生型菌株，核酸酶含量丰富，应加此步骤；如所用菌株为 XL-1 Blue 和 DH5α 等缺陷型菌株，核酸酶含量低，则可略过此步骤。
7. 加入 600 µL 漂洗液 WB（请先检查是否已加入无水乙醇！），12,000 rpm（13,400×g）离心 30 s，弃废液，重复此步骤。
8. 将吸附柱 AC 放回空收集管中，12,000 rpm（13,400×g）离心 2 min，尽量除去漂洗液，以免漂洗液中残留乙醇抑制下游反应。
9. 取出吸附柱 AC，放入一个干净的离心管中，在吸附膜的中间部位加 100-200 µL 洗脱缓冲液 EB（事先在 65-70℃ 水浴中加热效果更好），室温放置 5 min，12,000 rpm（13,400×g）离心 1 min。如果需要较多量质粒，可将得到的溶液重新加入离心吸附柱中，离心 1 min。
  - ▲ 洗脱体积越大，洗脱效率越高。如果需要质粒浓度较高，可以适当减少洗脱体积，但是最小体积不应少于 100 µL，体积过小降低质粒洗脱效率，减少质粒产量。

## 07/流程简图



## 08/相关产品

- AA0201 SPARKeasy 细菌基因组DNA快速提取试剂盒
- AA1904-A RNase A (10 mg/mL)
- AD0101 SPARKeasy 质粒小量极速提取试剂盒
- AD0102 SPARKeasy 高纯度质粒小量快速提取试剂盒
- AD0105 SPARKeasy 无内毒素质粒小提中量提取试剂盒
- AD0303 SPARKeasy 无内毒素高纯质粒大量提取试剂盒
- AE0101 胶回收/PCR产物纯化试剂盒
- AK0601 Spark HiFi Seamless Cloning Kit (1-5个片段)
- AK0603 Spark HiFi Seamless Cloning Kit (单片段)

本产品仅用于科学研究!

Tel: 0531-82387577

Web: <http://www.sparkjade.com>

Support: [support@sparkjade.com](mailto:support@sparkjade.com)

